

Phimosi – forhudsfor snævring

Forhudsfor snævring kan helbredes ved en operation, hvor den stramme bindevævsring på forhuden fjernes.

Før operationen

Du bedes medbringe et par stramme trusser samt et almindeligt hygiejnebind.

Er du i blodfortyndende behandling, bedes du aftale pause med klinikken. Du kan på forhånd tale med din egen læge om, hvorvidt det er forsvarligt at holde pause.

Operationen

Lokalbedøvelse sprøjtes ind under huden omkring penis. Der fjernes størstedelen af forhuden, hvorefter den resterende hud syes med tråde, der forsvinder af sig selv. Omkring såret lægges en forbindelse.

Lokalbedøvelsen skal virke i ca. ½ time, herefter tager operationen ca. ½ time.

Det frarådes at du kører selv.

Efter operationen

Forbindingen falder af indenfor det første døgn. Trådene forsvinder af sig selv indenfor 3-4 uger. Det endelige kosmetiske resultat ses efter ca. 3 mdr. Sygemelding evt. et par dage. Ved større blodansamling eller tegn på betændelse kan klinikken kontaktes i telefontiden eller uden for telefontiden kontaktes nærmeste vagtlæge eller skadestue. Ved akutte situationer: 40564996.

Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for en operation eller lignende.