

Gastroskopi - kikkertundersøgelse af mavesækken

Gastroskopi er en undersøgelse, som udføres med en bøjelig kikkert, ført igennem munden eller næsen og svælg for at undersøge spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Igennem kikkerten kan udtages vævsprøver. Undersøgelsen udføres som oftest for at afsløre forandringer som for eksempel mavesår, mavekatar, spiserørsbrok eller andet.

Før undersøgelsen:

Du skal møde fastende til undersøgelsen. Det vil sige, at du ikke må spise 6 timer før undersøgelsen og kun må drikke lidt vand indtil 2 timer før undersøgelsen. Nødvendig medicin kan tages med en mundfuld vand. Hvis du ønsker beroligende medicin under undersøgelsen, skal du sørge for hjælp til hjemtransport.

Undersøgelsen:

Undersøgelsen kan udføres gennem munden eller næsen. Såfremt du skal undersøges gennem næsen (de fleste) vil du få lagt lokalbedøvende gel i begge næsebor, som skal virke i et par minutter. Såfremt du skal undersøges gennem munden og ønsker det, kan svælg bedøves med lokalbedøvende spray.

Undersøgelsen foregår liggende på venstre side. Kikkerten føres igennem næsen/munden til spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Der er rigelig plads til at trække vejret igennem næse eller mund, som det nu falder mest naturligt. Der vil under undersøgelsen blive blæst luft ned i mavesækken for at skabe overblik. Dette vil give en kortvarig fornemmelse af oppustethed indtil luften suges op igen.

Undersøgelsen varer 3-5 minutter og opfattes af de fleste som let til moderat ubehagelig på grund af opkastningsreflekser.

Såfremt man finder undersøgelsen mere ubehagelig og har behov for beroligende medicin kan dette gives som en indsprøjtning i en blodåre.

Efter undersøgelsen:

Hvis du har fået beroligende medicin må du ikke arbejde eller køre bil samme dag. Hjemtransport med pårørende eller Falck.

Hvis du har fået svælgbedøvelse må du ikke spise eller drikke den første time efter undersøgelsen på grund af faren for at fejlsynke og få maden i den "gale hals" (luftrøret).

Ellers kan man spise og drikke umiddelbart efter undersøgelsen.
Halsen kan føles øm de første dage.

Komplikationer:

Ses stort set aldrig ved denne undersøgelse. Der er en meget lille risiko for at perforere spiserør, mavesæk eller tolvfingertarm. Forekommer ekstremt sjældent.

Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for en operation - eller lignende.